Фармакоэкономика

теория и практика

www.pharmacoeconom.com

- ❑ ФАРМАКОЭКОНОМИКА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
- ❑ МАТЕРИАЛЫ VIII КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 4-5 МАРТА 2014г., г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

№1 ^{Том 2}
2014

КУБАНСКИЙ РЕГИСТР ОСТРЫХ АОРТАЛЬНЫХ ДИСЕКЦИЙ ТИП А (КУБРАДА)

KUBAN REGISTER ACUTE AORTIC DISSECTION TYPE A (KUBRADA)

Болдырев С.Ю., Белаши С.А., Россиха О.А., Ким Г.И., Ясакова Е.П., Барбухатти К.О., Порханов В.А.
Boldyrev S.Y., Belash S.A., Rossokha O.A., Kim G.I., Yasakova E.P., Barbuhatti K.O., Porkhanov V.A.

Краевая клиническая больница № 1, Краснодар

Кафедра кардиохирургии и кардиологии ФПК и ППС, Кубанский государственный медицинский университет

Regional Clinical Hospital № 1, Krasnodar

Department of Cardiac Surgery and Cardiology FPK and PPC, Kuban State Medical University

Острая диссекция аорты тип А - жизнеугрожающее состояние, требующее неотложного хирургического вмешательства.

Цель исследования – анализ распространенности, хирургического лечения и результатов вмешательства у больных с острой диссекцией аорты тип А.

Методы исследования. Нами был создан Кубанский регистр острых аортальных диссекций тип А (КУБРАДА) - первый Российский локальный регистр острых аортальных диссекций тип А, где проживает около 5 миллионов жителей. Регистр был инициирован Кубанской рабочей группой хирургии аорты в 2011. Эта база данных была разработана для учета пациентов, кто был подвергнут хирургии с острой диссекцией восходящей и дуги аорты. Этот регистр включает период между 2003 и 2013 г.г. Параметры пациентов с диссекцией аорты включают информацию о пред- и интраоперационном-

статусе, предоперационных данных визуализации, нейропротекции, гипотермии, методах канюляции, перфузионной технике, операционной стратегии, послеоперационных осложнениях, среднепромежуточных результатах и причинах смерти.

Результаты. Текущий анализ включает 70 пациентов. 52 (74%) пациента мужчины, средний возраст 51 ± 11 лет (от 28 to 73). Аортальная регургитация 3 ст. отмечена у 11 (16%) пациентов. Госпитальная летальность составила 17% (12/70)

Заключение. КУБРАДА является первым опытом регистрации острых аортальных диссекций типа А. Все специалисты получают выгодную возможность анализа данных и оптимизации тактики лечения данной патологии