

№1 ^{Том 7}
2019

Фармакоэкономика

теория и практика



ФЭ

Pharmacoeconomics
theory and practice

№1 ^{Volume 7}
2019

- СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ (ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ СОГЛАСНО ИСХОДНОЙ (ОТ 28.08.2014) И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ (ОТ 29.10.2018) РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 871
- МАТЕРИАЛЫ XIV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – «ФАРМАКОЭКОНОМИКА 2019» 2 – 3 АПРЕЛЯ 2019, Г.САМАРА



АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ МЕТОДОМ АНКЕТИРОВАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ANALYSIS OF WOMEN'S USE OF COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES USING INTERNET-QUESTIONNAIRE

Луцевич К.А., Мелкумян Э.Х., Карагозян С.С.
Lutsevich K.A., Melcumyan E.H., Karagozyan S.S.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, г. Саратов, Россия
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

www.pharmacoeconom.com

DOI: <https://doi.org/10.30809/phe.1.2019.29>

Ключевые слова: комбинированные оральные контрацептивы, интернет-анкетирование.

Цель. Провести анализ использования комбинированных оральных контрацептивов (КОК) при помощи интернет-анкетирования.

Методы. В марте 2018г. проведено анкетирование 200 женщин по вопросам использования ими КОК. Анкета размещалась на сайте <https://www.testograf.ru/ru/>.

Результаты. Среди женщин, принявших участие в анкетировании, 30,0% представляли возрастную группу от 20 до 23 лет, 21,0% в возрасте 17-19 лет. 66,0% женщин, ответивших на вопросы анкеты, имели детей. КОК в качестве средства для предотвращения беременности применяли 53,0% опрошенных женщин, при этом 3,8% из них использовали еще какой-либо метод

контрацепции. Наиболее часто женщины называли в качестве используемого ими препарата Этинилэстрадиол+Дроспиренон (55,5%), комбинацию Этинилэстрадиола с Дезогестрелом использовали 12,0%, на третьем месте шла комбинация Этинилэстрадиол+Гестоден (9,0%). Всего упоминалось 12 препаратов (согласно МНН). Среди причин выбора применяемого препарата на первом месте являлось «назначение врача» (69,5%). Из положительных влияний КОК, чаще всего женщины называли стабилизацию менструального цикла (42,0%), из негативных – головные боли (12,0%).

Заключение. Более половины (53,0%) женщин, принявших участие в анкетировании, используют КОК в качестве противозачаточных средств. Наиболее часто в качестве используемого препарата называлась комбинация Этинилэстрадиол+Дроспиренон (55,5%).