№1 Том 7 2019

Фармакоэкономика
теория и практика

Pharmacoeconomics
theory and practice

№1 Volume 7 2019

- СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ (ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ СОГЛАСНО ИСХОДНОЙ (ОТ 28.08.2014) И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ (ОТ 29.10.2018) РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 871
- МАТЕРИАЛЫ XIV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – «ФАРМАКОЭКОНОМИКА 2019» 2 – 3 АПРЕЛЯ 2019, Г.САМАРА

www.pharmacoeconom.com

www.pharmacoeconom.com

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

ANALYSIS OF CONSUMER DEMAND FOR MEDICINES FOR THE TREATMENT OF COMMUNITY ACUTE PNEUMONIA

Умирова А.А., Кабакова Т.И.
Umirova A.A., Kabakova T.I.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета, г. Пятигорск, Россия
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - a branch of the Volgograd State Medical University, Pyatigorsk, Pyatigorsk, Russia

www.pharmacoeconom.com

DOI: https://doi.org/10.30809/phe.1.2019.49

Ключевые слова: лекарственные препараты, внебольничная пневмония, фармацевтические работники, пациенты, анкетирование, потребительский спрос.

Цель: Провести объемный анализ спроса на лекарственные препараты (ЛП) для лечения внебольничной пневмонии в розничном звене с позиции фармацевтических работников аптечных организаций.

Методы: Проведен социологический опрос фармацевтических работников путем анкетирования. Обработка данных проводилась методами группировки, сравнения и ранжирования показателей.

Результаты: На базе 64 аптечных организаций Кабардино -Балкарской Республики (КБР) установлен характерный портрет сотрудника: наиболее крупными категориями фармацевтических работников являются фармацевты со стажем работы от 5 до 10 лет, работающие в сетевых (18%) и частных (13%) аптечных организациях, а также провизоры и фармацевты со стажем работы до 5 лет, работающие в единичных частных аптеках (по 12%).

По мнению фармацевтических работников аптечных организаций, непосредственно занятых обслуживанием посетителей, ключевыми факторами, определяющими выбор пациента при покупке лекарственного препарата для лечения гриппа и простуды, являются цена и рекомендация фармработника (60% и 43% соответственно). Меньшую роль в выборе ЛП играют удобство применения (30%), реклама и собственный опыт пациента (по 27%). Важно отметить, что лишь 23% пациентов приобретали ЛП по рекомендации врача. Полученные данные коррелируют с результатами опроса, проведенного нами ранее среди врачей-экспертов: все специалисты сходятся во мнении, что самолечение пациентов усугубляет течение заболевания, развитие внебольничной пневмонии. Это подтверждают результаты анализа востребованности различных групп лекарственных препаратов: наиболее популярной респондентами названа группа средств для снятия симптомов (87%), которые «маскируют» проявление заболевания. Затем, с большим отрывом, следуют ЛП, применяемые непосредственно для симптоматической терапии – антибактериальные (17%), лекарственные препараты от кашля (27%), иммуностимуляторы (37%), наименьший интерес для пациентов представляют витамины (7%).

При этом важно отметить, что только 10% работников «первого стола» направляют пациентов с симптомами простуды к врачу, 70% отпускают лекарственные препараты самостоятельно, а пятая часть фармработников (20%) затруднились дать ответ.

Заключение: Согласно полученным данным, всего пятая часть пациентов при появлении симптомов простуды обращаются к врачу (23%). Определяющими критериями выбора пациентами ЛП являются цена и рекомендация фармацевтического работника аптечной организации. Такой подход к выбору лекарственной терапии допускает ошибочную постановку диагноза пациентов, и, как следствие, может усугубить течение и рецидивы внебольничной пневмонии. Таким образом, в КБР необходима целенаправленная работа по налаживанию дополнительных коммуникаций между врачами и фармацевтическими работниками аптечных организаций для улучшения приверженности пациентов к лечению и снижения случаев самолечения, это несомненно повысит качество их жизни.