№1 ^{Том 3}
2015

Фармакоэкономика

теория и практика

Pharmacoeconomics
theory and practice

№1 ^{Volume 3}
2015

- ❑ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
- ❑ IX НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – «ФАРМАКОЭКОНОМИКА – 2015»
16-17 марта 2015 г., УФА, AZIMUT ОТЕЛЬ УФА

АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

COST ANALYSIS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Почуприна А.А.

Pochuprina A.A.

ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России

FGBU NCESMP of Ministry of Health Russia

Цель: определить и сравнить уровень затрат на лечение пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) с помощью терапии белимумабом, в комбинации со стандартной терапией (СТ) в сравнении с применением только СТ.

Методы: дизайн исследования - ретроспективный. Оценка расходов, связанных с лечением СКВ, была проведена с использованием анализа затрат. Временной интервал исследования составил один год. Структура затрат была определена на основе результатов клинических исследований эффективности и безопасности применения белимумаба у пациентов с СКВ (BLISS-52 and BLISS-76).

Результаты. Затраты были распределены по следующим группам: затраты на фармакотерапию, затраты на оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, лечение осложнений СКВ, затраты на коррекцию нежелательных явлений, возникающих вследствие фармакотерапии СКВ. Расходы на стационарную помощь в группе лечения белимумабом в комбинации со СТ составили 52 991 руб., тогда как в группе СТ они составили 91 830 руб. Стоимость коррекции нежелательных явлений была равной 7 846 руб. и 7 763 руб., соответственно, в то время как затраты на лечение осложнений, связанных с СКВ, составили 370 229 руб. для группы лечения белимумабом в комбинации со СТ и 384 976 руб. для группы с применением только СТ.

Заключение. В связи с низкой частотой тяжелых обострений в группе лечения белимумабом, затраты на оказание стационарной медицинской помощи были ниже в данной группе, чем в группе с применением только СТ. Хороший профиль безопасности исследуемого препарата привел к сравнительно одинаковым затратам на коррекцию возникающих нежелательных явлений в обеих группах лечения. Уровень затрат на лечение осложнений вследствие активности СКВ был ниже в группе белимумаба, что связано с низкой частотой возникновения сердечно-сосудистых, легочных, почечных и кожных аутоиммунных повреждений при использовании белимумаба. Хороший профиль безопасности и эффективность препарата, доказанные в ходе клинических исследований, снижают затраты на оказание стационарной помощи и лечение осложнений у пациентов с СКВ.