

№1 Том3
2015

Фармакоэкономика
теория и практика

ФФФ

Pharmacoeconomics
theory and practice

№1 Volume3
2015

- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
- IX НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – «ФАРМАКОЭКОНОМИКА – 2015» 16-17 марта 2015 г., УФА, AZIMUT ОТЕЛЬ УФА

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF PHARMACOTHERAPY OF COMORBID PATHOLOGY OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Левитан А.И., Ардентова Н.Н., Решетько О.В.
Levitan A.I., Ardentova N.N., Reshet'ko O.V.

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского»
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky

Цель: провести фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапии коморбидной патологии опорно-двигательного аппарата у больных ревматоидным артритом (РА) и оценить соответствие данной терапии современным рекомендациям (Федеральным клиническим рекомендация по диагностике и лечению остеоартроза и остеопороза, 2013).

Методы: исследование проводилось на базе специализированного ревматологического стационара г.Саратова. Проведено открытое ретроспективное исследование, основанное на сплошном анализе историй болезни пациентов, обратившихся за помощью в период с января 2013 по октябрь 2013 года, с достоверным по классификационным критериям ACR (1987) диагнозом РА. Проанализировано 111 историй болезни, на каждый случай заполнялась специально разработанная индивидуальная регистрационная карта. Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Excel для Windows XP.

Результаты. У 90% пациентов наблюдался помимо РА еще и остеоартроз (ОА), причем в 39 % был выставлен диагноз вторичный ОА. Всем больным был назначен хондропротективный комбинированный препарат, содержащий глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат, которые рекомендуются при ОА для уменьшения боли и улучшения функции суставов (уровень доказательности А). Также 37,8% больных был назначен алфлутоп, являющийся экстрактом из морских организмов, рекомендации по использованию которого отсутствуют в настоящее время. РА является заболеванием, ассоциированным с высоким риском развития остеопороза (ОП) и остеопоротических переломов. Всем больным, получающим длительно глюкокортикостероиды, для профилактики глюкокортикоидного ОП должны быть рекомендованы кальций и витамин D3, что не было выполнено в 5,7% случаев. Проведение денситометрии на амбулаторном этапе было рекомендовано 70,2% больным. Всем пациентам (26,1%), имеющим в качестве осложнения ОП, были предписаны бисфосфонаты (препараты алендроновой и золендроновой кислоты). Бисфосфонаты, являются препаратами первой линии для профилактики и лечения ОП. Кроме того, 5,4% больных данные ЛС назначались с профилактической целью при отсутствии у них диагноза ОП.

Заключение. Основными коморбидными заболеваниями опорно-двигательного аппарата у больных РА являются ОА и ОП, лечение которых не в полной мере соответствует современным рекомендациям.