


№1 <sup>Том 6</sup>  
2018

**Фармакоэкономика**  
*теория и практика*



**Pharmacoeconomics**  
*theory and practice*

№1 <sup>Volume 6</sup>  
2018

- МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА QALY  
В ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКОВ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА
- РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ  
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
- XII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ  
И ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
«ФАРМАКОЭКОНОМИКА 2018»  
26-27 МАРТА 2018 г., ТЮМЕНЬ



## АНАЛИЗ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПАЦИЕНТАМ С ДИАГНОЗОМ ПОЛЛИНОЗ И АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ

## THE ANALYSIS OF MEDICAL APPOINTMENTS TO PATIENTS WITH THE DIAGNOSIS A POLLINOSIS AND AN ALLERGIC RHINITIS

*Прокопенко В.В., Кабакова Т.И.*

*Prokopenko V.V., Kabakova T.I.*

*Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета, г. Пятигорск*

*Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute of Volgograd Medical State University, Pyatigorsk, Russia*

www.pharmacoeconom.com

DOI: <https://doi.org/10.30809/phe.1.2018.34>

**Ключевые слова:** лекарственные препараты, назначения врачей, аллергический ринит, поллиноз.

**Цель:** изучить назначения врачей-аллергологов пациентам, проходящим лечение аллергического ринита и поллиноза на восстановительном этапе.

**Материалы и методы:** исследованы 646 врачебных назначений за 2009-2017 гг. Обработка результатов выполнена с использованием методов группировки, сравнения, контент-анализа справочной медицинской литературы, интервьюирования, непосредственного и документального наблюдения.

**Результаты:** в ходе ретроспективного анализа, выполненного в течение IV квартала 2017 г. нами были изучены 646 врачебных заключений пациентам с аллергическими заболеваниями, проходящим лечение в здравницах Кавказских Минеральных Вод (КМВ). В данных санаторно-курортных организациях пациенты разного возраста проходят лечение различных заболеваний: атопический дерматит, крапивница, отек Квинке, псориаз, аллергический ринит, поллиноз, себорея, ихтиоз, аллергический ларинготрахеит, экзема и другие. Из всех врачебных заключений, имеющих аллергический профиль нами отобраны 95 заключений пациентов с аллергическим ринитом и поллинозом, что составило 14,7% от всех заключений врачей-аллергологов за 2009-2017 гг. В 2017 г.

проходили лечение 15 (15,8%) пациентов с аллергическим ринитом и/или поллинозом, в 2016 г. – 15 (15,8%), в 2015 г. – 4 (4,2%), в 2014 г. – 4 (4,2%), в 2013 г. – 41 (43,2%), в 2012 г. – 4 (4,2%), в 2011 г. – 6 (6,3%), а в 2009 г. и ранее 6 (6,3%).

Выявлено, что в 77% назначений врачи выписывали пациентам антигистаминные лекарственные препараты (ЛП): Эриус, Фенкарол, Супрастин, Тизин – 61% и Офтан 48,4% случаев. Также врачи не менее часто (74,7%) назначают инъекции 10% раствора кальция глюконата внутримышечно, затем 30% раствор натрия тиосульфата внутривенно. В большинстве случаев (65,3%) врачи назначали 10 процедур электрофореза с 1% раствором димедрола, пенно-солодковые ванны или с хлоридом натрия – 13,7% назначений. Для стимулирования иммунитета выписывались Полиоксидоний (60%), Тактивин (55,8%) и Ликопид (54,8%). Наиболее редко врачи назначали Гистаглобулин (26,3%), Зиртек (24,2%), Интал (9,5%), Ринофлуимуцил (8,4%), Аллергодил (7,4%) и другие. Всем пациентам была рекомендована диета для исключения перекрестных аллергий.

**Выводы:** установлено, что высокоэффективной терапией аллергического ринита является комплексный подход к назначению пациентам антигистаминных, иммуностимулирующих ЛП, а также физиопроцедур, широко представленных в здравницах КМВ.